円に内接する四角形に内接するひし形について

1 はじめに

問題 12 円に内接する四角形 ABCD の 2 組の対辺のなす角の各 2 等分線 EO, FO は垂直であることを証明せよ。

この問題は、参考文献にある「わかる幾何学」の 134 ページに掲載されている。この問題からヒントを得て、次の問題を考え、中学生にも分かるように解いてみた。

2 考えた問題

$AB=a$, $BC=b$, $CD=c$, $DA=d$ である四角形 ABCD は円に内接している。このとき、四角形の各辺上に頂点をもつひし形について、

- (1) 一辺の長さを求めよ。
- (2) 面積を求めよ。

(解) (1) 与えられた図において、BA, CD の交点を E, BC, AD の交点を F とする。∠BEC の二等分線と BC, AD との交点をそれぞれ G, I, ∠BFA の二等分線と CD, AB との交点をそれぞれ H, J とすると、四角形 GHIJ がひし形になることを証明する。

(証明) EG と FJ の交点を K とする。

$\triangle JBF \sim \triangle HDF$ であるから、

$$\angle EJH = \angle JBF + \angle BFJ = \angle HDF + \angle DFH = \angle EHJ$$

よって $\triangle EJH$ は二等辺三角形となるから、

$$JK = KH, EK \perp JH \cdots \textcircled{1}$$

同様に、 $\triangle GBE \sim \triangle IDE$ であるから、

$$\angle FGI = \angle GBE + \angle BEG = \angle IDE + \angle DEI = \angle FIG$$

よって $\triangle FIG$ は二等辺三角形となるから、

$$IK = KG, FK \perp IG \cdots \textcircled{2}$$

①, ②より四角形 GHIJ において、対角線が垂直で、互いに他を二等分しているのでひし形となる。■

次に、便宜的に、 $EA=p$, $ED=q$, $FD=r$, $FC=s$ とおき、ひし形の一辺と面積を求める。

角の二等分と比の定理より、

$$\triangle FAB \text{ について, } AJ = \frac{a(d+r)}{(d+r)+(b+s)}, JB = \frac{a(b+s)}{(d+r)+(b+s)}, \triangle FDC \text{ について, } DH = \frac{cr}{r+s}$$

$$\triangle EBC \text{ について, } BG = \frac{b(a+p)}{(a+p)+(c+q)}, \quad GC = \frac{b(c+q)}{(a+p)+(c+q)}, \quad \triangle EAD \text{ について, } ID = \frac{dq}{p+q}$$

$\triangle JBF \sim \triangle HDF$ であるから, $JB : HD = BF : DF$

$$JB \cdot DF = HD \cdot BF \text{ より, } \frac{a(b+s)}{(d+r)+(b+s)} \times r = \frac{cr}{r+s} \times (b+s)$$

$$a \neq c \text{ のとき, } r+s = \frac{c(b+d)}{a-c} \dots \textcircled{1}$$

$a = c$ のとき, 四角形 ABCD は等脚台形となり, BC, CD, DA, AB の中点をそれぞれ G, H, I, J とすると, 四角形 GHIJ はひし形になる。この場合の一辺の長さや面積は後ほど考える。

同様に, $\triangle GBE \sim \triangle IDE$ であるから, $GB : BE = ID : DE$

$$GB \cdot DE = BE \cdot ID \text{ より, } \frac{b(a+p)}{(a+p)+(c+q)} \times q = (a+p) \times \frac{dq}{p+q}$$

$$b \neq d \text{ のとき, } p+q = \frac{d(a+c)}{b-d} \dots \textcircled{2}$$

$b = d$ のとき, 四角形 ABCD は等脚台形となり, この場合の一辺の長さや面積も後ほど考える。

$$\text{次に, } EJ = EH \text{ より } EA + AJ = ED + DH \text{ であるから, } p + \frac{a(d+r)}{(d+r)+(b+s)} = q + \frac{cr}{r+s}$$

$$q - p = \frac{a(d+r)}{(d+r)+(b+s)} - \frac{cr}{r+s}$$

$$\text{これに} \textcircled{1} \text{ を代入して整理すると, } q - p = \frac{d(a-c)}{b+d} \dots \textcircled{3}$$

$$\text{同様に, } FI = FG \text{ より } FD + DI = FC + CG \text{ であるから, } r + \frac{dq}{p+q} = s + \frac{b(c+q)}{(a+p)+(c+q)}$$

$$r - s = \frac{b(c+q)}{(a+p)+(c+q)} - \frac{dq}{p+q}$$

$$\text{これに} \textcircled{2} \text{ を代入して整理すると, } r - s = \frac{c(b-d)}{a+c} \dots \textcircled{4}$$

②, ③を p, q について解くと

$$p = \frac{d(ad+bc)}{(b+d)(b-d)}, \quad q = \frac{d(ab+cd)}{(b+d)(b-d)}$$

同様に, ①, ④を r, s について解くと

$$r = \frac{c(ab+cd)}{(a+c)(a-c)}, \quad s = \frac{c(ad+bc)}{(a+c)(a-c)}$$

$GI = EG - EI$ で, $EG = \sqrt{EB \cdot EC - BG \cdot CG}$, $EI = \sqrt{EA \cdot ED - AI \cdot DI}$ である。(※)

$$EG = \sqrt{EB \cdot EC - BG \cdot CG}$$

$$= \sqrt{(a+p)(c+q) - \frac{b(a+p)}{(a+p)+(c+q)} \cdot \frac{b(c+q)}{(a+p)+(c+q)}} = \frac{\sqrt{(a+p)(c+q)((a+c+p+q)^2 - b^2)}}{(a+c+p+q)}$$

$$\text{ここで, } a+p = a + \frac{d(ad+bc)}{(b+d)(b-d)} = \frac{b(ab+cd)}{(b+d)(b-d)}, \quad c+q = c + \frac{d(ab+cd)}{(b+d)(b-d)} = \frac{b(ad+bc)}{(b+d)(b-d)},$$

$$a+c+p+q=a+c+\frac{d(a+c)}{b-d}=\frac{b(a+c)}{b-d} \text{ より}$$

$$EG=\frac{\sqrt{\frac{b(ab+cd)}{(b+d)(b-d)} \cdot \frac{b(ad+bc)}{(b+d)(b-d)} \left[\left\{ \frac{b(a+c)}{b-d} \right\}^2 - b^2 \right]}}{\frac{b(a+c)}{b-d}} = \frac{b\sqrt{(ab+cd)(ad+bc)(a-b+c+d)(a+b+c-d)}}{(a+c)(b+d)(b-d)}$$

$$\text{同様に, } EI=\sqrt{EA \cdot ED - AI \cdot DI} \text{ を計算すると, } EI=\frac{d\sqrt{(ab+cd)(ad+bc)(a-b+c+d)(a+b+c-d)}}{(a+c)(b+d)(b-d)}$$

$$\text{よって, } GI=EG-EI=\frac{\sqrt{(ab+cd)(ad+bc)(a-b+c+d)(a+b+c-d)}}{(a+c)(b+d)} \dots \textcircled{5}$$

同様に, $HJ=FJ-FH=\sqrt{FA \cdot FB - AJ \cdot BJ} - \sqrt{FD \cdot FC - DH \cdot CH}$ を計算すると

$$HJ=\frac{\sqrt{(ab+cd)(ad+bc)(-a+b+c+d)(a+b-c+d)}}{(a+c)(b+d)} \dots \textcircled{6}$$

⑤, ⑥より, ひし形の一辺の長さは,

$$\sqrt{\left(\frac{GI}{2}\right)^2 + \left(\frac{HJ}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)}}{(a+c)(b+d)} \dots \textcircled{7}$$

最後に, $a=c$ のとき, 等脚台形 ABCD の BC, CD, DA, AB の中点をそれぞれ G, H, I, J とすると, 四角形 GHIJ はひし形となる。

$$GI=\sqrt{AB^2 - \left(\frac{BC-DA}{2}\right)^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{b-d}{2}\right)^2},$$

$$HJ=\frac{BC+DA}{2}=\frac{b+d}{2} \text{ であるから}$$

ひし形の一辺の長さは,

$$\sqrt{\left(\frac{GI}{2}\right)^2 + \left(\frac{HJ}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{GI^2 + HJ^2} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 - \left(\frac{b-d}{2}\right)^2 + \left(\frac{b+d}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{a^2 + bd}}{2}$$

この結果は, ⑦で $a=c$ と置いたものに一致する。

$b=d$ の場合も同様に⑦の結果と一致するから, 以上より

$$\text{ひし形の一辺の長さは } \frac{\sqrt{(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)}}{(a+c)(b+d)} \dots \text{ (答)}$$

(2) ⑤, ⑥より, $a \neq c, b \neq d$ のときは, ひし形の面積は,

$$\frac{1}{2} GI \cdot HJ = \frac{(ab+cd)(ad+bc)\sqrt{(-a+b+c+d)(a-b+c+d)(a+b-c+d)(a+b+c-d)}}{2(a+c)^2(b+d)^2} \dots \textcircled{8}$$

$a=c$ のとき, (1)より

$$GI = \sqrt{a^2 - \left(\frac{b-d}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{(2a-b+d)(2a+b-d)}}{2}, \quad HJ = \frac{b+d}{2} \text{ であるから}$$

$$\text{ひし形の面積は, } \frac{1}{2} GI \cdot HJ = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{(2a-b+d)(2a+b-d)}}{2} \cdot \frac{b+d}{2} = \frac{(b+d)\sqrt{(2a-b+d)(2a+b-d)}}{8}$$

この結果は、⑧で $a=c$ と置いたものに一致する。

$b=d$ の場合も同様に⑧の結果に一致するから、以上よりひし形の面積は、

$$\frac{(ab+cd)(ad+bc)\sqrt{(-a+b+c+d)(a-b+c+d)(a+b-c+d)(a+b+c-d)}}{2(a+c)^2(b+d)^2} \dots \text{ (答)}$$

3 補足

円に内接する四角形 ABCD の 4 辺の長さが、 $AB=a$, $BC=b$, $CD=c$, $DA=d$ であるとき、四角形 ABCD の面積 S は、

$$S = \frac{\sqrt{(-a+b+c+d)(a-b+c+d)(a+b-c+d)(a+b+c-d)}}{4} = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$$

$$\left(p = \frac{a+b+c+d}{2} \right)$$

であることが、知られている。(参考文献 [2] 参照)

これを用いると、ひし形の面積は、 $\frac{2(ab+cd)(ad+bc)}{(a+c)^2(b+d)^2} S$ と表すことができ、四角形 ABCD の面積 S との比がわかる。

また、四角形 ABCD の外接円の半径 R は

$$R = \frac{\sqrt{(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)}}{\sqrt{(-a+b+c+d)(a-b+c+d)(a+b-c+d)(a+b+c-d)}} = \frac{\sqrt{(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)}}{4S} \text{ であるから,}$$

ひし形の一辺の長さは、 $\frac{4S}{(a+c)(b+d)} R$ と表すことができ、四角形 ABCD の外接円の半径 R との比がわかる。

(参考文献 [2] 参照)

4 おわりに

具体例を作ってみた。高校生なら、どのように求めるのであろうか。

<p>AB=6, BC=8, CD=3, DA=4 である四角形 ABCD は円に内接している。四角形の各辺上に頂点をもつひし形について、</p> <p>(1) 一辺の長さを求めよ。</p> <p>(2) 面積を求めよ。</p>	<p>(答)</p> <p>(1) $\frac{10\sqrt{10}}{9}$</p> <p>(2) $\frac{50\sqrt{39}}{27}$</p>
--	---	--

【参考文献】

- [1] わかる数学全書Ⅲ わかる幾何学 (秋山武太郎著, 春日屋伸昌改訂/日新出版/1990年7月30日13版発行)
- [2] 時岡郁夫の Website (<http://www.phoenix-c.or.jp/~tokioka/>) にある「こだわり数学」58.円に内接する四角形の対角線について
- [3] (※) について, 時岡郁夫の Website (<http://www.phoenix-c.or.jp/~tokioka/>) にある「趣味の数学問題集」B112(3)にある内角の二等分線の公式を使用。

(2014/11/22 時岡)